

# FUNCTȚII SPECIALE EULER ȘI APLICAȚII

**Autor: Ecaterina SAVCIUC**  
**Coordonator științific: Aurica POPESCU**

Universitatea Tehnică a Moldovei

**Abstract:** Leonhard Euler a creat teoria funcțiilor speciale – cunoscute ca integralele Euler: Gamma funcția și Beta funcția. Ele generalizează funcția factorial la valori neîntregi și complexe ale lui  $n$ . Funcțiile speciale sunt tabulate și reprezintă componente a mai multor distribuții de probabilitate cu o largă aplicabilitate în combinatorică, teoria numerilor, teoria probabilității și statistică. Funcțiile speciale au o importanță mare prin faptul că cu ajutorul lor se calculează rapid clase de integrale definite și improprie.

**Cuvinte cheie:** Gamma funcție, Beta funcție, legătura dintre Gamma și Beta funcție și aplicații.

Funcția Gamma, introdusă și studiată de către Leonhard Euler reprezintă o generalizare a conceptului de factorial la numerele reale și la numerele complexe.

Gamma funcție sau integrala Euler de tip II:

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{p-1} dx, \quad (p > 0) \quad (1.1)$$

care este o integrală improprie cu limita de sus infinit și pentru  $p < 1$  la limita de jos. Gamma funcția este integrală convergentă.

Integrând prin părți primim prima formulă de reducere pentru Gamma funcție:

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \quad (p > 0) \quad (1.2)$$

Remarcăm:  $\Gamma(1) = 1$  și  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ .

$$\text{Pentru } n\text{-natural } \Gamma(n+1) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \cdot n = n! \quad (1.3)$$

Efectuând substituția  $x = t^2$  și apoi schimbând  $t$  cu  $x$  obținem a doua formulă de reducere pentru Gamma

$$\text{funcție: } \Gamma(p) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} x^{2p-1} dx \quad (p > 0) \quad (1.4)$$

Beta funcție, numită integrala Euler de primul tip, este o funcție specială definită de:

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0) \quad (2.1)$$

Pentru  $p < 1$  2.1 reprezintă integrală improprie cu limita inferioară, iar pentru  $p > 1$  cu limita superioară.

Efectuând substituția  $x = \cos^2 \varphi$  primim: (Noile limite  $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ )

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi \quad (p > 0, q > 0) \quad (2.2)$$

numită a doua exprimare Beta funcția.

Substituind în 2.1  $x = \frac{t}{t+1}$ , Beta funcție poate fi prezentată ca integrală improprie, numită a treia exprimare a funcției speciale:

$$B(p, q) = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx \quad (2.3)$$

$$\text{Parametri } p, q \text{ sunt simetrici: } B(p, q) = B(q, p) \quad (2.4)$$

Pentru  $n$  și  $m$  naturali:

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!} \quad (2.5)$$

Relația dintre Beta și Gamma:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad (2.6)$$

$$\text{Pentru cazul } B(p, 1-p) = E(p) \quad (2.7)$$

$$\text{unde } E(p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

Funcțiile Gamma și Beta generalizează funcția factorial la valori neîntregi și complexe ale lui  $n$ . Funcțiile speciale sunt componente a mai multor distribuții de probabilitate și deci au aplicații în combinatorică, teoria numerilor, teoria probabilității și statistică.

Analizăm exemple de calcul rapid a integralelor cu aplicarea funcțiilor speciale Euler:

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{4}}}{(1+x)^2} dx = B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\right)} = \frac{\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{1}{4}B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{5}{2}} x \cdot \cos^{\frac{3}{2}} x \cdot dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cdot \cos^{\frac{1}{2}} x \cdot 2 \sin x \cdot \cos x \cdot dx = (\text{Substituția: } \sin^2 x = z,$$

Noile limite  $0 \rightarrow 1$ ) =

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 z^{\frac{3}{4}} (1-z)^{\frac{1}{4}} dz = \frac{1}{2} \int_0^1 z^{\frac{7}{4}-1} (1-z)^{\frac{5}{4}-1} dz = \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{4} + \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(1 + \frac{3}{4}\right)\Gamma\left(1 + \frac{1}{4}\right)}{2\Gamma(1)} =$$

$$= \frac{1}{4} \frac{\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)} = \frac{3}{64} B\left(\frac{3}{4}, 1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{64}\pi.$$

$$3. \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = a \int_0^a x^2 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = (\text{Substituția: } \left(\frac{x}{a}\right)^2 = t, \text{ Noile limite } 0 \rightarrow 1) =$$

$$= \frac{a^4}{2} \int_0^1 t^{\frac{1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{a^4}{2} \int_0^1 t^{\frac{3}{2}-1} (1-t)^{\frac{3}{2}-1} dt = \frac{a^4}{2} B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{a^4}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right)} = \frac{\pi a^4}{16}.$$

### Bibliografia

1. E. Artin The Gamma Function New York, Holt, 1994.
2. O. Stănășilă Analiza matematică. Funcții speciale București, 2001.
3. Никифоров А. Ф. Основы теории специальных функций Москва, Наука, 2004.